

Calendrier vaccinal chez les enfants de 0 à 23 mois et la jeune fille

Contact	Age	Vaccin	Maladies
1	Naissance	BCG_VPO0	Tuberculose
2	A 6 semaines (2 mois)	DTC-HepB-Hib1, VPO1 , Rota1, Pneumo1	<ul style="list-style-type: none"> • Poliomyélite • Diphtérie • Tétanos • Coqueluche, • Hépatite virale B • Infections à Haemophilus influenzae type b, • Diarrhée à rota virus, • Infection à pneumocoque
3	A 10 semaines (3 mois)	DTC-HepB-Hib2, VPO2 Rota2, Pneumo2	
4	A 14 semaines (4 mois)	DTC-HepB-Hib3, VPO3, Pneumo3, VPI1	
5	A 09 mois	RR1_VAA_VPI2	
6	A 15 mois	RR2 MenA	Rougeole- Rubéole Méningite
Jeune fille	09 ans	VPH	Virus du Papillome Humain

Calendrier vaccinal

Calendrier vaccinal chez **femmes enceintes**

Contact	Antigènes	Date d'administration souhaitée	Durée de la protection acquise
1	Td1	Dès la grossesse (premier contact) 4 semaines au moins après Td1.	Nulle
2	Td2	Le Td2 doit être administré au moins 2 semaines avant l'accouchement pour que la protection soit transférée à l'enfant à la naissance	3 ans
3	Td3	Six (6) mois au moins après Td2	5 ans
4	Td4	12 mois au moins après Td3	10 ans
5	Td5	12 mois au moins Td4	A vie

Calendrier vaccinal chez les **personnes âgées de 12 ans et plus**

01	Pfizer1	12 ans et plus
01	Pfizer2	08 semaines après Pfizer1
Rappei	Pfizer3	06 mois après Pfizer2
01	Johnson & Johnson	12 ans et plus
Rappel	Johnson & Johnson	06 mois après J&J1